

もも・ネクタリン特報 No. ⑨

2020. 7. 17

J A 中野市営農センター

J A 中野市りんご・もも部会

せん孔細菌病（果実病斑）が散見されています。

引き続き、せん孔細菌病（枝病斑・葉病斑・果実病斑）を見つけ次第、除去して下さい。

また、新梢が繁茂している場合は、徒長枝の整理を行い樹冠内の日当たりを改善して下さい。

もも

第10回 定期散布

※なつっこ等、中生種最終防除（有袋栽培は徐袋後）

散布時期

7月下旬 ～ 8月初旬（第9回目の定期散布から14日後）

・散布日の目安：7月24日 ～ 8月2日

散布薬剤

水 100ℓ当り

展着剤（ハイテンパワー） 10ml

フルーツセイバー 50ml （収穫前日まで、3回以内）

アーデントフロアブル 50ml （収穫前日まで、3回以内）

散布日 月 日

散布量 ℓ

散布量

10アール当り 600ℓ

混用順

水 ⇒ 展着剤 ⇒ フルーツセイバー ⇒ アーデントフロアブル

対象病害虫

灰星病、黒星病、シンクイムシ類、カメムシ類、アザミウマ類

注意事項

①カイガラムシ類発生園は、コルト顆粒水和剤の2,000倍（前日、3回）を加用する。

②せん孔病発生園（晩生種）で袋掛けが終了していない場合は、スターナ水和剤1,000倍（収穫7日前、3回）を加用する。収穫前規制に注意する。

もも

第11回 定期散布

※川中島白桃等、晩生種最終防除（有袋栽培は徐袋後）

散布時期

8月上旬～中旬（第10回目の定期散布から14日後）

・散布日の目安：8月7日～16日

散布薬剤

水 100ℓ当り

展着剤（ハイテンパワー） 10ml

アルバリン顆粒水溶剤 50g （収穫前日まで、3回以内）

オーシャインフロアブル 50ml （収穫前日まで、3回以内）

散布日 8月 日

散布量 ℓ

散布量

10アール当り 600ℓ

混用順

水 ⇒ 展着剤 ⇒ アルバリン顆粒水溶剤 ⇒ オーシャインF

対象病害虫

灰星病、黒星病、ホモプシス腐敗病、シンクイムシ類、モモハモグリガ、アブラムシ類

注意事項

①ミカンキイロアザミウマ発生園は、ディアナWDGの10,000倍（前日、2回）を加用する。

②せん孔病発生園（晩生種）で袋掛けが終了していない場合は、スターナ水和剤1,000倍（収穫7日前、3回）を加用する。収穫前規制に注意する。

次ページには、ネクタリンの定期防除について記載しています

ネクタリン

第10回 定期散布

散布時期	7月下旬（第9回目の定期散布から14日後）		散布日	月	日
	・散布日の目安： <u>7月25日 ～ 31日</u>		散布量		リットル
散布薬剤	水 100ℓ当り				
	展着剤（ハイテンパワー）	10ml			
〔	フルーツセイバー	50ml	（収穫前日まで、3回以内）		
	アーデントフロアブル	50ml	（収穫前日まで、3回以内）		
散布量	10アール当り 600ℓ				
混用順	水 ⇒ 展着剤 ⇒ フルーツセイバー ⇒ アーデントフロアブル				
対象病害虫	黒星病、灰星病、ホモプシス腐敗病、シンクイムシ類、カメムシ類				

ネクタリン

第11回 定期散布

散布時期	8月上旬～中旬（第10回目の定期散布から14日後）			散布日	8月	日
	・散布日の目安： <u>8月8日～14日</u>			散布量		リットル
散布薬剤	水 100ℓ当り					
	展着剤（ハイテンパワー）	10ml				
	〔 アルバリン顆粒水溶剤	50g	（収穫前日まで、3回以内）			
	オーシャインフロアブル	50ml	（収穫前日まで、3回以内）			
散布量	10アール当り 600ℓ					
混用順	水 ⇒ 展着剤 ⇒ アルバリン顆粒水溶剤 ⇒ オーシャインF					
対象病害虫	黒星病、灰星病、ホモプシス腐敗病、 シンクイムシ類、モモハモグリガ、カメムシ類					
注意事項	もも混植園： <u>ミカンキイロアザミウマ発生園は、ディアナWDGの10,000倍</u> <u>（前日、2回）を加用する。</u>					

注意事項（もも・ネクタリン共通）

※せん孔細菌病発生園（晩生品種）で袋掛けが完了していない園地では、定期散布にスターナ水和剤1,000倍（収穫7日前、3回）を加用する。

※今後の栽培管理作業、収穫開始時期一覧表は、7月2日発行のもも・ネクタリン特報号外をご覧ください。