

もも・ネクタリン特報 No. ⑩

2020. 8. 3

J A 中野市営農センター

J A 中野市りんご・もも部会

- ・晩生種以降の収穫期は、平年から5日程早いと予想されます。
- ・今後収穫を迎える品種で灰星病等の腐敗性病害の発生が心配される場合は、下記の薬剤を特別散布してください。
オンリーワン F (2,000倍、前日、3回) または、プリント F (2,000倍、前日、もも3回、ネク2回)

***もも極晩生種 (白根白桃、幸茜、さくら、黄貴妃等)、ネクタリン秀峰、最終防除**

***有袋栽培で除袋が間近な場合は、除袋後に散布する**

もも

第12回 定期散布

散布時期 8月下旬 (第11回目の定期散布から14日後)

・散布日の目安: 8月21日 ~ 30日

散布日 月 日

散布量 リットル

散布薬剤 水 100ℓ当り

展着剤 (ハイテンパワー) 10ml

ベルコートフロアブル 50ml (収穫前日まで、3回以内)

散布量 10アール当り 600ℓ

混用順 水 ⇒ 展着剤 ⇒ ベルコートF

対象病害虫 灰星病、黒星病、ホモプシス腐敗病

*シンクイムシ類・アザミウマ類、その他害虫の発生が心配される場合は、イカズチWDGの1,500倍(前日、5回)を加用する。

ネクタリン

第12回 定期散布

散布時期 8月下旬 (第11回目の定期散布から14日後)

・散布日の目安: 8月22日 ~ 28日

散布日 月 日

散布量 リットル

散布薬剤 水 100ℓ当り

展着剤 (ハイテンパワー) 10ml

ベルコートフロアブル 50ml (収穫前日まで、2回以内)

散布量 10アール当り 600ℓ

混用順 水 ⇒ 展着剤 ⇒ ベルコートF

対象病害虫 黒星病、灰星病、ホモプシス腐敗病

*シンクイムシ類・アザミウマ類、その他害虫の発生が心配される場合は、イカズチWDGの1,500倍(前日、2回)を加用する。

次ページには、もも晩生種目揃会、ファンタジア目揃会のお知らせを掲載しています。

ご確認下さい。

もも「晩生種」栽培者の皆様へのお知らせ

もも晩生種 出荷目揃会の開催について

標記の件につきまして、下記のとおり目揃会を開催しますので、出荷者全員のご出席をお願いします。

●日時・場所 *いずれかの会場へ出席をお願いします。

期 日	時 間	場 所
8月17日(月)	14:00～	南部 共選所
8月19日(水)	10:30～	平岡 共選所

収穫開始予想

川中島白桃：8月20日～25日

黄金桃：8月25日～30日

※多雨・日照不足により果肉先行・着色不良の傾向です。除袋遅れには注意してください。

現在、収穫期を迎えた品種については、熟度を優先して収穫を進めてください。

ネクタリン「ファンタジア」栽培者の皆様へのお知らせ

ファンタジア 出荷目揃会の開催について

標記の件につきまして、下記のとおり目揃会を開催しますので、出荷者全員のご出席をお願いします。

●日時・場所 *いずれかの会場へ出席をお願いします。

期 日	時 間	場 所
8月21日(金)	14:00～	南部 共選所
8月21日(金)	11:00～	平岡 共選所

収穫開始予想

ファンタジア：8月25日～30日