

ぶどう特報No.10



No.10 2020.8.3
JA中野市営農センター
JA中野市ぶどう部会

- ・各品種玉の肥大が順調に推移しております。昨年同様巨峰の玉伸びが良好で色上がり心配されます。
- ・べと病・黒とう病が一部園地で発生中。黒系は収穫期の晩腐病の発生が心配されます。
- ・連続した降雨で枝が徒長しています。防除前には枝整理を実施して農薬がかかりやすいようにしてください。

第14回【ぶどう定期最終防除】(べと病、さび病防除)

散布時期	前回から10日後(8月中下旬)	散布品種	全品種
散布薬剤	水		100 ℓ
	アピオン-E	-	100 ml
	ICボルドー66D	-	2.5 kg
	ビッグマグ	葉色向上	100 g
			散布日 月 日
			葉面散布剤です。
散布量	400ℓ/10a		
注意点	ICボルドー66Dに代えて4-4式ボルドー液を使用してもよい。【作り方はぶどう特報No.9参照】 ① ICボルドー66Dに代えて4-4式ボルドー、コサイド3000 2,000倍、ムッシュボルドーDF500倍を使用してもよい。(収穫時の粉立ちが心配な方は推奨) コサイド、ムッシュ使用時薬害心配な園はクワソ100倍を加用する。 ② ボルドー液散布の際は、近隣園に飛散しないよう注意する。(汚れ・もも・プラム等への薬害)		

【10月以降の出荷特別散布】

散布時期	9月上旬～	散布品種	全品種
散布薬剤	水		100 ℓ
	アピオン-E	-	100 ml
	ICボルドー66D	-	2.5 kg
	ビッグマグ	葉色向上	100 g
			散布日 月 日
			葉面散布剤です。
散布量	400ℓ/10a		
注意点	ICボルドー66Dに代えて4-4式ボルドー液を使用してもよい。【作り方はぶどう特報No.9参照】 【※散布時は隣接園へ絶対に飛散しないように注意する。】 ① ICボルドー66Dに代えて4-4式ボルドー、コサイド3000 2,000倍、ムッシュボルドーDF500倍を使用してもよい。(収穫時の粉立ちが心配な方は推奨) コサイド、ムッシュ使用時薬害心配な園はクワソ100倍を加用する。		

今後の管理について(裂果対策・害虫対策)

1. 裂果対策

- ・長雨の予報があれば降雨前にビニールを幹周辺に敷き、吸水防止をする。
- ・急激な水分ストレス緩和のため定期的なかん水を実施する。

2. 病害虫

- ・クビアカスカシバ(主幹害虫)の被害(幹に虫糞がついている(おがくずのようなもの))を確認する。例年入る畑やピオーネ、パープルなどは要注意。

3. 着色促進について

- ・黒や赤色系のぶどうは房に光が当たるように房上の新梢管理(副梢の切除)を実施する。
- ・ナガノパープルやクイーンニーナなど着色が心配な品種はタイバックや反射マルチを敷く。
- ・樹勢が強く、例年着色が悪い園はメリット赤300倍をボルドー散布時に混用する。

今年のぶどう特報は今回で終了です