

- ☆ 7月上～中旬：平均気温 22.3℃（平年比 1～2℃低い）、降水量 209mm（平年比 180%）
- ☆ 各品種、収穫開始期が予想よりも早まっており、園地によっては昨年よりも7日以上進んでいる状況です。
降水量が多かったため、果肉の軟化が早まる傾向です。収穫遅れのないようご注意ください。
- ☆ 今後、シンクイムシ類の発生が一気に増加する時期となります。
10日間隔の防除を徹底し、薬液が果実に十分かかるよう散布量にもご注意ください。

7/29 スモモヒメシンクイ発生状況(フェロモントラップ調査)

* ()内、前回 7/15 調査数

上今井 - 6頭 (18) 草間 - 1頭 (9) 一本木 - 15頭 (17) 倭 - 8頭 (68)

【重要】シンクイムシ類の被害果は除去し、園外で処理をお願いします。

1. プラム 薬剤散布

第14回

2回分の防除を掲載しております

・散布時期： 8月11日～20日頃（第13回目の薬剤散布から約10日後）

・散布薬剤： 水 100ℓ当り

・散布日 8月 日
 ・散布量 ℓ

展着剤（まくぴか） 20ml
 オルフィンプラスフロアブル 33ml （前日、3回）
 アーデントフロアブル 50ml （前日、3回）

・対象病害虫：灰星病（すす点病）、ハダニ類、（シンクイムシ類）、（ケムシ類）

・散布量：10a当り SS500ℓ 動噴600ℓ

・注意事項

- ① アーデントフロアブルに代えて、テッパン液剤の2,000倍（前日、2回）または、アルバリン顆粒水溶剤の2,000倍（前日、3回）を使用してもよい。

第15回

・散布時期： 8月21日～30日頃（第14回目の薬剤散布から約10日後）

・散布薬剤： 水 100ℓ当り

・散布日 8月 日
 ・散布量 ℓ

展着剤（まくぴか） 20ml
 エクシレルSE 40ml （前日、3回）
 フルーツセイバー 66ml （前日、3回）

・対象病害虫：灰星病、シンクイムシ類、ケムシ類

・散布量：10a当り SS500ℓ 動噴600ℓ

・注意事項

- ① シンクイムシ類の発生が多い場合は、モスピラン顆粒水溶剤の4,000倍（前日、3回）を加用する。
- ② フルーツセイバーに代えて、オーシャインフロアブルの3,000倍（前日、3回）を使用してもよい。

（＊ブルーンの防除は次ページに掲載しております）

2. プルーン 薬剤散布

2 回分の防除を掲載しております

(第 1 0 回)

・ 散布時期： 8 月 9 日～1 5 日（第 9 回目防除から約 10 日後）

・ 散布薬剤： 水 1 0 0 ㍓当り

・ 散布日	8 月	日
・ 散布量		ℓ

パレード15フロアブル	50ml	（前日、2回）
アーデントフロアブル	50ml	（前日、3回）

・ 対象病害虫： 灰星病、ハダニ類、（シンクイムシ類）

・ 散布量： 1 0 a 当り SS500㍓ 動噴 600㍓

・ 注意事項

- ① 展着剤を使用する場合は、「まくぴか」の 5000 倍を使用する。
- ② パレード 15 フロアブルに代えて、オーシャインフロアブルの 3,000 倍（前日、3 回）を使用してもよい。
- ③ アーデントフロアブルに代えて、テッパン液剤の 2,000 倍（前日、2 回）または、アルバリン顆粒水溶剤の 2,000 倍（前日、3 回）を使用してもよい。

(第 1 1 回)

・ 散布時期： 8 月 1 9 日～2 5 日（第 1 0 回目防除から約 10 日後）

・ 散布薬剤： 水 1 0 0 ㍓当り

・ 散布日	8 月	日
・ 散布量		ℓ

オンリーワンフロアブル	50ml	（前日、3回）
エクシレルSE	40ml	（前日、2回）

・ 対象病害虫： 灰星病、カメムシ類、（シンクイムシ類）

・ 散布量： 1 0 a 当り SS500㍓ 動噴 600㍓

・ 注意事項

- ① 展着剤を使用する場合は、「まくぴか」の 5000 倍を使用する。

資材課からのお知らせ

- ・ 劇物をご購入の際は、印鑑をご持参ください。
- ・ 予約農薬・果実袋等を返品される場合は、早めの持ち込みをお願いします。また、納品書をご持参下さい。

（次回特報発行予定 8/17 プラム、プルーン特報 No.12 「9 月の特別散布」）