



# ナシ特報・西洋梨

No.7

令和2年8月17日  
JA中野市営農センター  
JA中野市ナシ部会

7月の園地点検お疲れ様でした。今後の作業として、引き続き定期的な防除と徒長枝整理を行い園地内に十分日光が当たるようにしてください。また、収穫まで高温干ばつが予想されるため十分な灌水を行ってください。

## ◆ 西洋梨（有袋）の薬剤散布（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください。）

### 【有袋】9月上中旬の薬剤散布（前回より20日後）

|       |                                                        |       |      |                |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|------|----------------|
| 散布時期  | 9 月 5 日～10 日    *左記は目安となります                            |       |      | ◆ 散布日：9 月    日 |
|       |                                                        |       |      | ◆ 散布量：    リットル |
| 散布薬剤  | 水                                                      | 1 0 0 | リットル |                |
|       | 展着剤                                                    | 1 0   | ml   |                |
|       | ストロビードライフフロアブル                                         | 5 0   | g    | (前日、3 回)       |
|       | ダントツ水溶剤                                                | 5 0   | g    | (前日、3 回)       |
| 対象病害虫 | 輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類、ケムシ類、コナカイガラムシ類                       |       |      |                |
| 散 布 量 | 10 a 当り：600 リットル                                       |       |      |                |
| 注意事項  | ① ラ・フランス、バラード等の最終散布。                                   |       |      |                |
|       | ② ストロビードライフフロアブルに代えて、キノンドー顆粒水和剤 1,000 倍（3 日前、9 回）でもよい。 |       |      |                |

### 目揃会開催について

|                | 期日       | 時間     | 場所       |
|----------------|----------|--------|----------|
| オーロラ<br>M・マリーラ | 8月18日（火） | 11：00～ | 南部共選所    |
|                |          | 14：00～ | 長丘研修センター |

### 【重要】収穫期間見込み

※果肉先行により昨年より早まる見込みです。

オーロラ : 8/20 ～ 8/30 頃  
Mマリーラ : 8/25 ～ 9/6 頃  
バラード : 9/10 ～ 9/20 頃  
ラ・フランス : 9/23 ～ 9/30 頃

※目揃会に参加ができない方は、各共選所に目揃会資料をご用意致しますので、各自お持ちください。

西洋梨（無袋）の薬剤散布は次ページをご覧ください

西洋梨（無袋）の薬剤散布（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください。）

【無袋】8月下旬の薬剤散布（前回より10日後）

|       |                                                                                                                                      |      |          |          |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---|
| 散布時期  | 8月25日前後 ※左記は目安となります                                                                                                                  |      |          | ◆ 散布日：8月 | 日 |
| 散布薬剤  | 水                                                                                                                                    | 100ℓ |          | ◆ 散布量：   | ℓ |
|       | 展着剤                                                                                                                                  | 10ml |          |          |   |
|       | キノンドー顆粒水和剤                                                                                                                           | 100g | (3日前、9回) |          |   |
|       | 劇イカズチWDG                                                                                                                             | 66g  | (前日、3回)  |          |   |
| 対象病害虫 | 輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類、(ハダニ類)                                                                                                             |      |          |          |   |
| 散布量   | 10アール当たり：600ℓ                                                                                                                        |      |          |          |   |
| 注意事項  | <p>① 収穫中のオーロラに散布する場合は、3日間間隔をあけて収穫をしてください。</p> <p>② ハダニ類対策：コロマイト乳剤1,000倍（前日、1回）を加用する。</p> <p>③ イカズチWDGは劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。</p> |      |          |          |   |

【無袋】9月中旬の薬剤散布（前回から10日後）

|       |                                                                                                                                                  |      |           |          |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|---|
| 散布時期  | 9月10日前後 ※左記は目安となります                                                                                                                              |      |           | ◆ 散布日：9月 | 日 |
| 散布薬剤  | 水                                                                                                                                                | 100ℓ |           | ◆ 散布量：   | ℓ |
|       | 展着剤                                                                                                                                              | 10ml |           |          |   |
|       | ベルコートフロアブル                                                                                                                                       | 50ml | (14日前、5回) |          |   |
|       | ダントツ水溶剤                                                                                                                                          | 50g  | (前日、3回)   |          |   |
| 対象病害虫 | 輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類、ケムシ類、コナカイガラムシ類                                                                                                                 |      |           |          |   |
| 散布量   | 10アール当たり：600ℓ                                                                                                                                    |      |           |          |   |
| 注意事項  | <p>① バラード等の最終散布。（収穫期間：9/10～20）</p> <p>② バラードへ散布する場合はベルコートフロアブルに代えて、キノンドー顆粒水和剤1,000倍（3日前、9回）を散布する。</p> <p>③ ベルコートフロアブルは、ル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。</p> |      |           |          |   |

【無袋】9月下旬の薬剤散布（前回から10日後）

|       |                        |      |         |          |   |
|-------|------------------------|------|---------|----------|---|
| 散布時期  | 9月20日前後 ※左記は目安となります    |      |         | ◆ 散布日：9月 | 日 |
| 散布薬剤  | 水                      | 100ℓ |         | ◆ 散布量：   | ℓ |
|       | 展着剤                    | 10ml |         |          |   |
|       | ストロビードライフロアブル          | 50g  | (前日、3回) |          |   |
| 対象病害虫 | 輪紋病                    |      |         |          |   |
| 散布量   | 10アール当たり：600ℓ          |      |         |          |   |
| 注意事項  | ① ラ・フランス、シルバーベル等の最終散布。 |      |         |          |   |