

☆ 生育状況は、昨年よりも7日程度（園地によっては、10日程度）進んでいる状況です。

果肉の軟化が早い傾向です。収穫遅れのないよう注意をお願いします。

☆ シンクイムシ類の発生が急増する時期です。スモモヒメシンクイだけでなく、モモシンクイガの被害も散見されます。薬剤散布間隔は、10日以内を厳守して下さい。

8/5 スモモヒメシンクイ発生状況(フェロモントラップ調査)

* ()内、前回 7/29 調査数

上今井 - 7頭(6) 草間 - 14頭(1) 一本木 - 14頭(15) 倭 - 42頭(8)

【重要】シンクイムシ類の被害果は、園外へ除去し処理をお願いします。

1. プラム 薬剤散布 秋姫など晩生種 特別散布

・散布時期： 9月1日～10日頃（第15回目の薬剤散布から約10日後）

・散布薬剤： 水 100ℓ当り

・散布日	9月	日
・散布量		ℓ

{	展着剤（まくぴか）	20ml	
	パレード15フロアブル	50ml	（前日、2回）
	アルバリン顆粒水溶剤	50g	（前日、3回）

・対象病害虫：灰星病、シンクイムシ類、カメムシ類、アブラムシ類

・散布量 ：10a当り SS500ℓ 動噴 600ℓ

・注意事項 ：収穫中の品種に散布した場合は、丸1日収穫を休む。

2. ブルーン 薬剤散布（晩生種 特別散布）

・散布時期： 8月29日～9月5日（第11回目の防除から約10日後）

・散布薬剤： 水 100ℓ当り

・散布日	月	日
・散布量		ℓ

{	オーシャインフロアブル	33ml	（前日、3回）
	劇モスピラン顆粒水溶剤	50g	（前日、3回）

・対象病害虫：灰星病、カメムシ類、（シンクイムシ類）

・散布量 ：10a当り SS500ℓ 動噴 600ℓ

・注意事項 ：収穫中の品種に散布した場合は、丸1日収穫を休む。

資材課からのお知らせ

・劇物をご購入の際は、印鑑をご持参ください。

・予約農薬・果実袋等を返品される場合は、早めの持ち込みをお願いします。

＊返品の際は、必ず納品書をご持参下さい。

（次回特報 発行予定9/2 プラム、ブルーン：収穫後のボルドー散布）