

8-9 月のアメリカシロヒトリの防除対策について

2020 年

JA 中野市園芸課

発生が目立っています。大型化すると防除が困難になります。早めに防除を行ってください。

1. 防除時期

- 老齢幼虫になると発生密度が高くなり、葉を暴食するので薬剤による防除は困難になる。
- 孵化直後の幼虫は巣網を張って群生し、葉脈を残して葉を食べるため、被害葉は透けてみえる。次第に巣網は大きくなり、目につきやすくなり、その後、幼虫は分散する。

2. 薬剤防除について（下記の薬剤は全て JA で取り扱っています）

時期	薬剤名	倍率	適用
8 月	トレボン乳剤（合成ピレ） ＊普通物	1,000	野菜・樹木類
	アーデントフロアブル（合成ピレ） ＊普通物	2,000	果樹・野菜
	バイスロイドEW（合成ピレ） ＊劇物	2,000	果樹
	アディオンフロアブル（合成ピレ） ＊普通物	1,500	果樹
	イカズチWDG（合成ピレ） ＊劇物	1,500	果樹

◆ 注意事項

- ① 多発時（盛夏期）は薬剤効果が著しく低下するので、その場合は速効的にかつ残効が長い合成ピレスロイド剤を使用してください。
- ② 定期散布や特別散布を実施する場合は、年間の使用回数制限に注意してください。
- ③ 各農薬使用の際は、ラベル等をよく確認し、使用規制・回数等を遵守してください。