



今回の内容：特別散布について 着色資材について

・病害防除は予防散布が基本となりますので、散布予定日に降雨が予想される場合は前倒しで散布してください。

9月も高温が続く予報です。害虫発生が心配される場合は、9月上中旬の定期散布(散布時期9/10～)、または、特別散布にて対応をお願いします。詳細は、果樹特報No.9(注意事項欄)をご参照下さい。

【ハダニ対策】：アカリタッチ乳剤の1,000倍(前日、－)

【シンクイムシ、リンゴワタムシ対策】：ダントツ水溶剤の2,000倍(前日、3回)

## ● 特別散布 9月下旬

散布時期	9/24～29頃 *前回から14日後	【9月下旬 特別散布】 散布日： 9月 日 散布量： リットル
散布薬剤	水 1000 展着剤(ハイテンパワー) 10ml ストライド顆粒水和剤 66g (前日、3回)	
対象病害虫	炭そ病、斑点落葉病、褐斑病、すす点病、すす斑病、黒星病	
散布量	10a当り 6000	
注意事項	①【果実軟化対策】カルタスの1,000倍～1,200倍を加用する。 ②【代替】ハイテンパワーに替えてササラ2,000倍でもよい。 ③【薬害注意】ストライド顆粒水和剤は、高温時に散布すると薬害が生じる恐れがある。	

## ➔ りんご着色資材の使用例

高温により着色遅れが心配されますので、下記資材を参考に定期散布に加用して下さい。

- 対象：シナノスイート・ふじ等
- 下記資材は全て定期散布に混用可能です。選択により使用して下さい。

商品名	使用目的	倍率	使用時期	単価/規格	農薬混用
彩色甘味 (おすすめ!)	着色促進 糖度向上	1,000	9月上旬～10月初旬 (収穫予定40日前と20日前の2回散布が効果的)	3,100円/500g	可
モーニングエース	着色促進 品質向上	500	9月上旬～10月初旬 (収穫予定30日前と15日前の2回散布が効果的)	6,230円/500ml	可
メリット赤	着色促進 樹勢調節	300	9月上旬～10月初旬 (収穫予定2カ月前から3回散布が効果的)	8,260円/6kg	可
葉友	着色促進 花芽充実	2,000	9月上旬～10月初旬 (収穫予定2カ月前から3回散布が効果的)	4,320円/1リットル	可

### ◆ 使用例

- ① 彩色甘味：9月上旬・下旬の2回散布 ⇒ シナノスイート等対象
- ② 彩色甘味：9月下旬・10月初旬の2回散布 ⇒ ふじ対象
- ③ モーニングエース：9月中旬・10月初旬(反射マルチ敷き前)に500倍で2回散布 ⇒ ふじ対象
- ④ メリット赤：9月上旬・中旬・下旬に300倍で3回散布 ⇒ ふじ・シナノスイート等対象
- ⑤ 葉友：9月上旬・中旬・下旬に2,000倍で3回散布 ⇒ ふじ・シナノスイート等対象