



【重要】市田柿（おひな柿）苗木注文について

本年、苗木の生育不良により業者が販売を中止したため市田柿（おひな柿）の注文ができません。ご迷惑おかけしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。

病害虫防除

隣接園(特に収穫期の作物)に飛散しないように注意して下さい。

共通注意事項

- 1.園地の病害虫の発生状況をよく確認し、適切な防除を行きましょう。
- 2.隣接園（特に今後収穫期を迎える作物）に飛散しないよう十分注意する。
- 3.散布後は、タンク内や散布器具の洗浄を十分に行い、薬液が残らないよう注意する。

●9月上旬の散布（着色開始期前）

散布薬剤	水	100ℓ	散布日	9月	日
	展着剤(ハイテンパワー)	10ml	散布量		ℓ
対象病害虫	①モスピラン顆粒水溶剤	25g	(前日、3回)		
	キノドー顆粒水和剤	100g			
散布量	10a当り 500ℓ *若木の場合、樹体にしっかり散布できる量を散布する。				
備考	① 果実全体に薬液がよくかかるよう散布する。 ② モスピラン顆粒水溶剤は劇物登録農薬です。 農薬(毒物・劇物)をお買い求めの際には、印鑑をご持参下さい。				

●特別散布

散布時期	10月上中旬 (水 100ℓあたり)	散布日	10月	日
散布農薬	展着剤(ハイテンパワー) 10ml トップジンM水和剤 100g (前日、6回)	散布量		ℓ
対象病害虫	うどんこ病 炭疽病			
散布量	10a当り 500ℓ			
注意事項	条紋から発生する裂果・ヒビ割れ部への腐敗性病害の侵入対策として有効。条紋多発園で散布する。			