

- この特報は、5/17 発行の「もも・ネクタリン特報No.⑤」の薬剤散布（散布目安は、6/5～10 頃）が終わってから行なう防除を掲載しています。特報No.⑤の内容を再度、ご確認ください。
- 本年、せん孔細菌病（枝・葉病斑）が散見されています。再度、菌密度低下に向けて病斑の除去の徹底をお願い致します。また、【縮葉病】発生園地では発病葉を出来るだけ除去し、次年度の越冬菌量を減らしましょう。

もも・ 第8回薬剤散布

散布時期	6 / 20 ~ 25 頃 (目安となります)	◆ 散布日：6月 日
散布薬剤	水	100ℓ 当り
	展着剤 (ハイテンパワー)	10ml
	ナリアWDG	50g (前日、2回)
	劇イカズチWDG	66g (前日、5回)
対象病害虫	黒星病、灰星病、ホモプシス腐敗病 シンクイムシ類、モモハモグリガ、カメムシ類、アザミウマ類	
散布量	10アール当り：500ℓ	
注意事項	①晩生種 <u>せん孔細菌病対策</u> ※収穫前規制に注意する。 マイコシールドの1,500倍(21日前、5回)を加用する。 ②ナリアWDGはぶどう(ピオーネ、サニールージュ)、西洋梨(ル・レクチュエ)に薬害を生じるため、飛散しないよう注意する。	

ネクタリン 第8回薬剤散布

散布時期	6 / 20 ~ 25 頃 (目安となります)	◆ 散布日：6月 日
散布薬剤	水	100ℓ 当り
	展着剤 (ハイテンパワー)	10ml
	ナリアWDG	50g (前日、2回)
	劇イカズチWDG	66g (前日、2回)
対象病害虫	黒星病、灰星病、ホモプシス腐敗病 シンクイムシ類、モモハモグリガ、カメムシ類、アザミウマ類	
散布量	10アール当り：500ℓ	
注意事項	①ナリアWDGはぶどう(ピオーネ、サニールージュ)、西洋梨(ル・レクチュエ)に薬害を生じるため、飛散しないよう注意する。	

次回特報配布

発行予定日：6月16日
7月上旬の薬剤散布について
散布日目安：7月5～10日頃