

# もも・ネクタリン特報 No. **11**

2023. 8. 17

J A 中野市営農センター

J A 中野市りんご・もも部会

※もも極晩生種（ゴールドデンピーチ、西王母、等）**特別防除**

※有袋栽培で除袋が間近な場合は、除袋後に散布する。

## ※農薬散布時の注意事項

①隣接園・今後収穫期を迎える作物に飛散しないよう十分注意する。

②散布後は、タンク内や散布器具の洗浄を十分に行い、薬液が残らないよう注意する。

もも		特別散布		散布日 月 日	
散布時期	9 / 5 ~ 1 5 頃 (目安となります)			散布量	
散布薬剤	水	1 0 0 0 当り		リットル	
	展着剤 (ハイテンパワー)	1 0 mℓ			
	オンリーワンフロアブル	5 0 mℓ (前日、3回)			
対象病害虫	黒星病、灰星病、ホモプシス腐敗病				
散布量	1 0 アール当り : 5 0 0 リットル				
注意事項	①オンリーワンフロアブルに代えて、オーシャインフロアブルの2,000倍(前日、3回)でもよい。 ②シンクイムシ類・アザミウマ類対策：(劇)イカズチWDGの1,500倍(前日、5回)を加用する。				

## ●今後、収穫を迎える品種で灰星病の発生が見られる場合は、殺菌剤の特別散布を実施して下さい。

	薬剤の系統	薬剤名	使用濃度	適正使用基準	使用上の注意事項
もも	エルゴステロール 生合成阻害剤(DMI)	スコア顆粒水和剤	2000倍	収穫前日まで(3回)	1. ベルクートは、バラ・メロンに薬害を生じるのでかからないようにする。 2. ダコニール1000は、除袋直後に散布すると薬害が発生する場合がありますので注意する。
		オーシャインフロアブル	2000倍	収穫前日まで(3回)	
		オンリーワンフロアブル	2000倍	収穫前日まで(3回)	
ネクタリン	エルゴステロール 生合成阻害剤(DMI)	スコア顆粒水和剤	2000倍	収穫前日まで(2回)	1. ダコニール1000は、除袋直後に散布すると薬害が発生する場合がありますので注意する。
		オンリーワンフロアブル	2000倍	収穫前日まで(3回)	
	その他	ベルコートフロアブル ダコニール1000	2000倍 1000倍	収穫前日まで(3回) 収穫前日まで(6回)	
	その他	ダコニール1000	1000倍	収穫前日まで(2回)	

## 「晩生種～極晩生種」収穫開始予想

直前の気象条件により前後しますが、下表を参考に、果実の状況を見て収穫適期を判断して下さい。

早生種(あかつき)・中生種(なつっこ)等の経過を見ると、7月下旬～8月上旬の連続した高温により生育が停滞し、平年並み～やや早い収穫状況でした。そのため、晩生種以降の品種の収穫は、平年並み～1・2日程早く設定しております。 ※収穫前に必ず食味・糖度チェックをし収穫を進めて下さい。

品 種	南部地区	平岡地区
幸茜	9 / 1	9 / 3
さくら白桃	9 / 5	9 / 8
黄貴妃(無着色)	9 / 3	9 / 5
選抜白根白桃(岩戸系)	9 / 5	9 / 7
在来系白根白桃	9 / 10	9 / 12
ゴールドデンピーチ	9 / 13	9 / 15
秀峰(ネクタリン)	9 / 3	9 / 5