

凍霜害の備えを万全にして、樹全体で着果量の確保をお願い致します。
平岡太陽満開 4/6
 4月10日に長丘観測所にて-3.2℃を記録しました。現在経過観察中ですが、引き続き凍霜害の危険がありますので、今後も気象情報に十分注意し、防霜対策に備えて下さい。
 4月上旬以降も平均気温が平年より2.4℃高く推移し、生育は平年より10日程早く進んでいる状況です。

1. プラム 【第4回 定期防除】 対象病害虫：黒斑病（かいよう病）アブラムシ類

散布時期	・ 4月下旬～5月初旬 （第3回定期散布（落花後）から10日後）	
散布薬剤	水 100ℓ当り 展着剤（ハイテンパワー） 10mℓ ウララDF 50g （7日前、2回） マイコシールド 50g （21日前、3回）	散布日 _____ 月 _____ 日 散布量 _____ ℓ
散布量	10aあたり 400ℓ	
注意事項	①【ケムシ類 マイマイガ対策】サムコルフロアブル10の2500倍（3日前、3回）を加用する。 5月末までの農薬散布は葉・果実ともに軟弱なため、時間帯・薬液量等、十分注意する。	

2. プルーン

プルーンの第3回定期防除は、次号（5月1日発行、プラム・プルーン特報No.5）に掲載します。

次面も必ずご覧ください

3. 「毛バタキ」の保管方法について（授粉期間終了後）

- ① 毛バタキに残った花粉やホコリ等を十分に掃除する。
 - ・コンプレッサーがあれば、エアーの力で残った花粉やホコリ等を掃除する。
 - ・中性洗剤、ぬるま湯で軽くもみ洗いし、よく濯ぐ。
- ② 直射日光を避け、「日陰干し」を行ない、十分乾燥させる。
 - ・直射日光に当てると繊毛（センモウ）がくっ付いてしまいます。
- ③ 密封が可能な袋や箱に毛バタキを入れ、市販の防虫剤を入れてから密封し、湿気のない場所で保管する。（高温多湿を避ける）