

# サクランボ特報 No. 4

J A 中野市営農センター

J A 中野市サクランボ部会

生育は4月下旬の気温（平年比-0.4℃）により、やや遅延ぎみに進んでいますが、開花期間が長くバラつきが見られます。凍霜害による花器異常で結実不良の被害が見られます。結実不良の園地は、摘果を行わず着果量を確保するよう努めて下さい。また、次年度の花芽充実のため新梢管理を実施し、樹冠内の明るさを確保して下さい。

収穫開始期は「香夏錦・高砂」が6月5日～10日頃、「佐藤錦」が6月10日～15日頃と予想されます。

定期防除・管理作業は遅れないよう計画的に実施しましょう。

## 第5回 定期散布（高砂、佐藤錦等の最終防除）

対象病害虫：灰星病、炭そ病、黒斑病、褐色せん孔病、オウトウショウジョウバエ、ハマキムシ類

散布時期	・5月下旬＊前回の散布から14日後（散布日の目安：5月22日～29日）	
散布薬剤	水 100ℓ当り オンリーワンフロアブル 50ml（前日、3回） ディアナWDG 10g（前日、2回）	散布日 ____ 5月 ____ 日  散布量 ____ ℓ
散布量	10aあたり 500ℓ	
注意事項	① 展着剤は加用しない。	

## 第6回 定期散布（紅秀峰、紅きらり等の最終防除）

対象病害虫：灰星病、炭そ病、黒斑病、褐色せん孔病（幼果菌核病）、オウトウショウジョウバエ

散布時期	・6月中旬＊前回の散布から14日後（散布日の目安：6月6日～13日）	
散布薬剤	水 100ℓ当り ナリアWDG 50g（前日、3回以内） コルト顆粒水和剤 10g（前日、3回以内）	散布日 ____ 6月 ____ 日  散布量 ____ ℓ
散布量	10aあたり 500ℓ	
注意事項	①ナリアWDGは、ぶどう（ピオーネ）洋なし（ル・レクチェ）等に薬害が生じるので、飛散しないようにする。 ②展着剤は加用しない。	

栽培日誌の完全記帳、出荷時まで提出をお願いします

次面もご覧ください。

## ●着色管理

- (1) 摘芯・誘引を実施して、下垂している結果枝は支柱や枝つりをする
- (2) 葉摘み
  - ・収穫予定の7～10日前頃から行い、果実に直接覆いかぶさる葉を摘み取る
  - ・摘み取る葉数は、果そう葉の3分の1程度を限度に、できるだけ少なめにとどめる。⇒肥大に影響
- (3) 葉上げ（雨よけハウスで実施）
  - 葉摘みには限界があるので、輪ゴム・テープナー等で葉を束ねる
- (4) 反射マルチ
  - ・着色始め頃から設置する
  - ・高温対策として、白色マルチは「タイベック」「パールライトWS」等を使用する
  - ・着色を得られた部分は、マルチを早めに除去する

## ●その他

- ・雨よけハウスの被覆 ⇒ 5月20日～25日頃
- 高温による着色不良やウルミ果の発生を防ぐため、晴天時は天窓・サイドビニールを開ける

次回特報発行予定日：6月17日      問合先：園芸課・担当 横田（080-5147-8257）